

**SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
DIRECCION GENERAL DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA,
ACUICOLA Y PESQUERA**

FRESA

INGREDIENTE ACTIVO	FORMULACION %		PLAGA	DOSIS	USO AGRICOLA
ABAMECTINA(AVERMECTINA)	CONCENTRADO EMULSIONABLE	002	Tetranychus urticae	80-100 ml/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
ABAMECTINA(AVERMECTINA)	CONCENTRADO EMULSIONABLE	002	Phytonemus pallidus	80-100 ml/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
ABAMECTINA(AVERMECTINA)	CONCENTRADO EMULSIONABLE	002	Tetranychus urticae	100 ml/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
ABAMECTINA(AVERMECTINA)	CONCENTRADO EMULSIONABLE	002	Tetranychus urticae	0.5-1.2 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
ABAMECTINA(AVERMECTINA)	CONCENTRADO EMULSIONABLE	002	Tetranychus urticae	0.4-0.6 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
ABAMECTINA(AVERMECTINA)	CONCENTRADO EMULSIONABLE	002	Tetranychus urticae	720 ml/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
ABAMECTINA(AVERMECTINA)	CONCENTRADO EMULSIONABLE	002	Tetranychus sp.	0.5-1.2 ml/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
ABAMECTINA(AVERMECTINA)	CONCENTRADO EMULSIONABLE	002	Steneotarsonemus pallidus	0.5-1.2 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
ABAMECTINA(AVERMECTINA)	CONCENTRADO EMULSIONABLE	002	Steneotarsonemus pallidus	80-100 ml/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
ACEQUINOCYL	SUSPENSION CONCENTRADA	016	Tetranychus urticae	0.75-2.0 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
ANILAZINA	POLVO HUMECTABLE	050	Botrytis cinerea	2-4 K/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
AZADIRACTINA	CONCENTRADO EMULSIONABLE	003	Trichoplusia ni	0.244-0.777 ml/400 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
AZINFOS METILICO	CONCENTRADO EMULSIONABLE	022	Frankliniella fusca	1.5-2.5 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
AZINFOS METILICO	CONCENTRADO EMULSIONABLE	020	Pentatrichopus sp.	1.5-2.0 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
AZINFOS METILICO	CONCENTRADO EMULSIONABLE	020	Thrips sp.	1.5-2.5 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
AZINFOS METILICO	CONCENTRADO EMULSIONABLE	021	Thrips sp.	1.5-2.5 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
AZINFOS METILICO	CONCENTRADO EMULSIONABLE	020	Pentatrichopus sp.	1.5-2 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
AZINFOS METILICO	CONCENTRADO EMULSIONABLE	020	Heliothis sp.	1.5-2 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
AZINFOS METILICO	CONCENTRADO EMULSIONABLE	022	Epitrix sp.	1.5-2.0 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
AZINFOS METILICO	CONCENTRADO EMULSIONABLE	021	Heliothis sp.	1.5 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
AZINFOS METILICO	POLVO EN BOLSA SOLUBLE EN AGUA	035	Frankliniella sp.	0.9-1.4 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
AZINFOS METILICO	POLVO HUMECTABLE	050	Pentatrichopus sp.	0.7-1.0 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.

**SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
DIRECCION GENERAL DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA,
ACUICOLA Y PESQUERA**

FRESA

INGREDIENTE ACTIVO	FORMULACION %	PLAGA	DOSIS	USO AGRICOLA	
AZINFOS METILICO	POLVO HUMECTABLE	035	Spodoptera exigua	1.0-1.5 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
AZINFOS METILICO	POLVO HUMECTABLE	035	Trichoplusia ni	1.0-1.5 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
AZINFOS METILICO	POLVO HUMECTABLE	035	Thrips sp.	1.0-1.5 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
AZINFOS METILICO	POLVO HUMECTABLE	035	Thrips sp.	850-1400 G	APLICACION AL FOLLAJE.
AZINFOS METILICO	POLVO HUMECTABLE	035	Spodoptera exigua	1-1.5 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
AZINFOS METILICO	POLVO HUMECTABLE	035	Plutella xylostella	1.0-1.5 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
AZINFOS METILICO	POLVO HUMECTABLE	035	Phyllotreta sp.	1.0-1.5 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
AZINFOS METILICO	POLVO HUMECTABLE	035	Murgantia histrionica	1.0-1.5 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
AZINFOS METILICO	POLVO HUMECTABLE	035	Leptophobia aripa	1.0-1.5 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
AZINFOS METILICO	POLVO HUMECTABLE	050	Heliothis sp.	0.75-1.0 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
AZINFOS METILICO	POLVO HUMECTABLE	035	Pentatrichopus sp.	1.0-1.5 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
AZINFOS METILICO	POLVO HUMECTABLE	035	Heliothis sp.	1.0-1.5 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
AZINFOS METILICO	POLVO HUMECTABLE	035	Artogeia rapae	1.0-1.5 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
AZINFOS METILICO	POLVO HUMECTABLE	035	Helicoverpa zea	1-1.5 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
AZINFOS METILICO	POLVO HUMECTABLE	035	Copitarsia consueta	1.0-1.5 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
AZINFOS METILICO	POLVO HUMECTABLE	035	Thrips sp.	0.8-1.5 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
AZINFOS METILICO	SUSPENSION ACUOSA	032	Heliothis sp.	1.0-1.5 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
AZINFOS METILICO	SUSPENSION ACUOSA	032	Thrips sp.	1.0-1.5 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
AZINFOS METILICO	SUSPENSION ACUOSA	032	Pentatrichopus sp.	1.0-1.5 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
AZINFOS METILICO	SUSPENSION ACUOSA	032	Heliothis sp.	1-1.5 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
AZINFOS METILICO	SUSPENSION ACUOSA	032	Spodoptera exigua	1.0-1.5 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
AZUFRE ELEMENTAL	GRANULO FINO CONCENTRADO	080	Sphaerotheca humuli	400 g/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
AZUFRE ELEMENTAL	GRANULOS DISPERSABLES	080	Sphaerotheca macularis	0.2-0.4 kg/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
AZUFRE ELEMENTAL	POLVO	093	Tetranychus sp.	15-30 K/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
AZUFRE ELEMENTAL	POLVO	093	Tetranychus sp.	10-15 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
AZUFRE ELEMENTAL	POLVO	098	Tetranychus sp.	15-30 kg/H	APLICACION AL FOLLAJE.
AZUFRE ELEMENTAL	POLVO	093	Ucinula necator	15-30 kg/H	APLICACION AL FOLLAJE.
AZUFRE ELEMENTAL	POLVO	093	Sphaerotheca macularis	10-15 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
AZUFRE ELEMENTAL	POLVO	093	Sphaerotheca humuli	10-15 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
AZUFRE ELEMENTAL	POLVO	093	Sphaerotheca macularis	15-25 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
AZUFRE ELEMENTAL	POLVO HUMECTABLE	065	Sphaerotheca humuli	10-15 kg/H	APLICACION AL FOLLAJE.
AZUFRE ELEMENTAL	POLVO HUMECTABLE	093	Sphaerotheca macularis	10-15 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
AZUFRE ELEMENTAL	POLVO HUMECTABLE	050	Tetranychus urticae	15-25 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
AZUFRE ELEMENTAL	SUSPENSION ACUOSA	050	Tetranychus telarius	2.0-3.0 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
AZUFRE ELEMENTAL	SUSPENSION ACUOSA	052	Sphaerotheca humuli	250-300cc/100 L	APLICACION AL FOLLAJE.
AZUFRE ELEMENTAL	SUSPENSION ACUOSA	050	Sphaerotheca humuli	2.0-3.0 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
AZUFRE ELEMENTAL	SUSPENSION ACUOSA	052	Sphaerotheca macularis	2.5-3.0 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
AZUFRE ELEMENTAL	SUSPENSION ACUOSA	052	Steneotarsonemus pallidus	2.5 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
AZUFRE ELEMENTAL	SUSPENSION ACUOSA	052	Steneotarsonemus pallidus	2.5-3.0 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.

**SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
DIRECCION GENERAL DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA,
ACUICOLA Y PESQUERA**

FRESA

INGREDIENTE ACTIVO	FORMULACION %	PLAGA	DOSIS	USO AGRICOLA	
AZUFRE ELEMENTAL	SUSPENSION ACUOSA	052	Steneotarsonemus pallidus	250-300cc/100 L	APLICACION AL FOLLAJE.
AZUFRE ELEMENTAL	SUSPENSION ACUOSA	052	Tetranychus telarius	2.5 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
AZUFRE ELEMENTAL	SUSPENSION ACUOSA	052	Mycosphaerella fragariae	2.5-3.0 L/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
AZUFRE ELEMENTAL	SUSPENSION ACUOSA	052	Sphaerotheca humuli	1.0-1.5 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
AZUFRE ELEMENTAL	SUSPENSION ACUOSA	052	Tetranychus urticae	2.5-3.0 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
AZUFRE ELEMENTAL	SUSPENSION ACUOSA	052	Tetranychus sp.	2.5-3.0 L/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
AZUFRE ELEMENTAL	SUSPENSION ACUOSA	052	Podosphaera leucotricha	10-15 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
AZUFRE ELEMENTAL	SUSPENSION ACUOSA	052	Sphaerotheca humuli	2.5 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
AZUFRE ELEMENTAL	SUSPENSION ACUOSA	052	Mycosphaerella fragariae	250-300cc/100L	APLICACION AL FOLLAJE.
AZUFRE ELEMENTAL	SUSPENSION ACUOSA	052	Mycosphaerella fragariae	250-300cc/100 L	APLICACION AL FOLLAJE.
AZUFRE ELEMENTAL	SUSPENSION ACUOSA	052	Mycosphaerella fragariae	200-300cc/100L	APLICACION AL FOLLAJE.
AZUFRE ELEMENTAL	SUSPENSION ACUOSA	052	Mycosphaerella fragariae	250-300 cc	APLICACION AL FOLLAJE.
AZUFRE ELEMENTAL	SUSPENSION ACUOSA	052	Botrytis cinerea	2.5-3.0 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
AZUFRE ELEMENTAL	SUSPENSION ACUOSA	052	Botrytis cinerea	2.5 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
AZUFRE ELEMENTAL + OXICLORURO DE COBRE	SUSPENSION ACUOSA	057	Mycosphaerella fragariae	2.5-3.0 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
AZUFRE ELEMENTAL + OXICLORURO DE COBRE	SUSPENSION ACUOSA	057	Mycosphaerella fragariae	2.5-3 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
BACILLUS SUBTILIS	POLVO HUMECTABLE	010	Botrytis cinerea	6-8 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
BACILLUS SUBTILIS	POLVO HUMECTABLE	010	Sphaerotheca macularis	6-8 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
BACILLUS THURINGIENSIS	GRANULOS DISPERSABLES	008	Helicoverpa zea	0.75-1.0 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
BACILLUS THURINGIENSIS	GRANULOS DISPERSABLES	003	Trichoplusia ni	0.5-1.0 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
BACILLUS THURINGIENSIS	GRANULOS DISPERSABLES	003	Trichoplusia ni	0.5-2.0 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
BACILLUS THURINGIENSIS	GRANULOS DISPERSABLES	006	Trichoplusia ni	0.75-1.0 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
BACILLUS THURINGIENSIS	GRANULOS DISPERSABLES	008	Trichoplusia ni	0.75-1.0 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
BACILLUS THURINGIENSIS	GRANULOS DISPERSABLES	003	Trichoplusia ni	0.600-2.200 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
BACILLUS THURINGIENSIS	GRANULOS DISPERSABLES	006	Trichoplusia ni	0.5-1.0 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
BACILLUS THURINGIENSIS	GRANULOS DISPERSABLES	003	Spodoptera exigua	0.600-2.200 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
BACILLUS THURINGIENSIS	GRANULOS DISPERSABLES	003	Heliothis sp.	0.6-1.0 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
BACILLUS THURINGIENSIS	GRANULOS DISPERSABLES	003	Helicoverpa zea	0.5-1.0 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
BACILLUS THURINGIENSIS	GRANULOS DISPERSABLES	008	Anticarsia gemmatalis	0.75-1.0 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
BACILLUS THURINGIENSIS	GRANULOS DISPERSABLES	003	Heliothis sp.	0.600-2.200 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
BACILLUS THURINGIENSIS	POLVO HUMECTABLE	006	Trichoplusia ni	0.25-1.0 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
BACILLUS THURINGIENSIS	POLVO HUMECTABLE	003	Heliothis sp.	0.5-1.0 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
BACILLUS THURINGIENSIS	POLVO HUMECTABLE	010	Trichoplusia ni	0.5-1.5 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
BACILLUS THURINGIENSIS	POLVO HUMECTABLE	006	Trichoplusia ni	5.25-1.0 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
BACILLUS THURINGIENSIS	POLVO HUMECTABLE	006	Trichoplusia ni	0.25-0.5 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
BACILLUS THURINGIENSIS	POLVO HUMECTABLE	004	Trichoplusia ni	1.5-2.0 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
BACILLUS THURINGIENSIS	POLVO HUMECTABLE	003	Trichoplusia ni	0.5-1.0 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
BACILLUS THURINGIENSIS	POLVO HUMECTABLE	006	Trichoplusia ni	2.0 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
BACILLUS THURINGIENSIS	POLVO HUMECTABLE	010	Heliothis sp.	0.5-1.25 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.

**SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
DIRECCION GENERAL DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA,
ACUICOLA Y PESQUERA**

FRESA

INGREDIENTE ACTIVO	FORMULACION %	PLAGA	DOSIS	USO AGRICOLA	
BACILLUS THURINGIENSIS	POLVO HUMECTABLE	006	Helicoverpa zea	2.0 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
BACILLUS THURINGIENSIS	POLVO HUMECTABLE	003	Helicoverpa zea	0.5-1.0 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
BACILLUS THURINGIENSIS	POLVO HUMECTABLE	006	Helicoverpa zea	0.25-0.5 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
BACILLUS THURINGIENSIS	POLVO HUMECTABLE	004	Helicoverpa zea	1-1.5 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
BACILLUS THURINGIENSIS	POLVO HUMECTABLE	006	Spodoptera exigua	0.25-0.5 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
BACILLUS THURINGIENSIS	POLVO HUMECTABLE	006	Spodoptera exigua	1.0 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
BACILLUS THURINGIENSIS	SUSPENSION ACUOSA	026	Helicoverpa zea	150-200 cc/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
BACILLUS THURINGIENSIS	SUSPENSION ACUOSA	011	Trichoplusia ni	1.0-2.0 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
BACILLUS THURINGIENSIS	SUSPENSION ACUOSA	026	Heliothis virescens	150-200 cc/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
BACILLUS THURINGIENSIS	SUSPENSION ACUOSA	026	Trichoplusia ni	150-200 cc/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
BENOMILO	POLVO HUMECTABLE	050	Sphaerotheca humuli	0.6 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
BENOMILO	POLVO HUMECTABLE	050	Sphaerotheca humuli	350-500 g/100 L	APLICACION AL FOLLAJE.
BENOMILO	POLVO HUMECTABLE	050	Sphaerotheca humuli	400-600 g/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
BENOMILO	POLVO HUMECTABLE	050	Sphaerotheca macularis	400-600 g/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
BENOMILO	POLVO HUMECTABLE	050	Sphaerotheca macularis	400-600 g/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
BENOMILO	POLVO HUMECTABLE	050	Botrytis cinerea	250-350 g/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
BENOMILO	POLVO HUMECTABLE	050	Mycosphaerella fragariae	250-350 g/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
BENOMILO	POLVO HUMECTABLE	050	Botrytis cinerea	400-600 g/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
BENOMILO	POLVO HUMECTABLE	050	Diplocarpon earliana	400-600 g/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
BENOMILO	POLVO HUMECTABLE	050	Diplocarpon earliana	400-600 g/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
BENOMILO	POLVO HUMECTABLE	050	Botrytis cinerea	400-600 g/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
BIFENTRINA	CONCENTRADO EMULSIONABLE	012	Tetranychus urticae	500 cc/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
BIFENTRINA	POLVO HUMECTABLE	010	Tetranychus urticae	500 g/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
BIFENTRINA + ABAMECTINA	CONCENTRADO EMULSIONABLE	004	Tetranychus urticae	1.5-2.0 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
BOSCALID	GRANULOS DISPERSABLES	050	Botrytis cinerea	1-1.2 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
CAPTAN	POLVO HUMECTABLE	050	Mycosphaerella fragariae	3-4 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
CAPTAN	POLVO HUMECTABLE	050	Mycosphaerella fragariae	3.0-4.0 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
CAPTAN	POLVO HUMECTABLE	050	Mycosphaerella fragariae	3.0-4.0 g/100L	APLICACION AL FOLLAJE.
CAPTAN	POLVO HUMECTABLE	050	Mycosphaerella fragariae	1-1.5 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
CAPTAN	POLVO HUMECTABLE	050	Botrytis cinerea	3.0-4.0kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
CAPTAN	POLVO HUMECTABLE	050	Botrytis cinerea	3.0-4.0 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
CAPTAN	POLVO HUMECTABLE	050	Botrytis cinerea	3.0-4.0 kg/ha.	APLICACION AL FOLLAJE.
CAPTAN	POLVO HUMECTABLE	050	Botrytis cinerea	3-4 kg/ha ó 200-400g/100L agua	APLICACION AL FOLLAJE.
CAPTAN	POLVO HUMECTABLE	050	Botrytis cinerea	3-4 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
CAPTAN	SUSPENSION ACUOSA	035	Mycosphaerella fragariae	3-4 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
CAPTAN	SUSPENSION ACUOSA	036	Botrytis cinerea	3.0-3.5 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
CAPTAN	SUSPENSION ACUOSA	038	Mycosphaerella fragariae	500 cc/100 l de agua	APLICACION AL FOLLAJE.
CAPTAN	SUSPENSION ACUOSA	035	Botrytis cinerea	3-4 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.

**SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
DIRECCION GENERAL DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA,
ACUICOLA Y PESQUERA**

FRESA

INGREDIENTE ACTIVO	FORMULACION %	PLAGA	DOSIS	USO AGRICOLA	
CARBARILO	POLVO HUMECTABLE	080	Heliothis sp.	2-2.5 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
CARBARILO	SUSPENSION ACUOSA	024	Helicoverpa zea	5-7 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
CARBARILO	SUSPENSION ACUOSA	043	Helicoverpa zea	3-4 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
CARBARILO + ENDOSULFAN	POLVO HUMECTABLE	070	Helicoverpa zea	2-3 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
CARBOFURAN	GRANULADO	005	Phyllophaga sp.	6-12g/m2	APLICACIÓN AL SUELO.
CARBOFURAN	GRANULADO	005	Meloidogyne sp.	30-40 kg/ha	APLICACIÓN AL SUELO.
CARBOFURAN	GRANULADO	005	Xiphinema americanum	30-40 kg/ha	APLICACIÓN AL SUELO.
CARBOFURAN	GRANULADO	005	Phylloxera sp.	30-40 kg/ha	APLICACIÓN AL SUELO.
CARBOFURAN	GRANULADO	005	Phyllophaga sp.	25-50 kg/ha	APLICACIÓN AL SUELO.
CARBOFURAN	GRANULADO	005	Phyllophaga sp.	6-12 g/m2	APLICACIÓN AL SUELO.
CARBOFURAN	GRANULADO	005	Phyllophaga sp.	10-50 kg/ha	APLICACIÓN AL SUELO.
CARBOFURAN	GRANULADO	005	Pentatrichopus sp.	10-15 kg/ha	APLICACIÓN AL SUELO.
CARBOFURAN	GRANULADO	010	Agrotis sp.	3-6 g/m2	APLICACIÓN AL SUELO.
CARBOFURAN	GRANULADO	005	Elasmopalpus lignosellus	10-15 kg/ha	APLICACIÓN AL SUELO.
CARBOFURAN	GRANULADO	005	Dorylaimus sp.	10-15 kg/ha	APLICACIÓN AL SUELO.
CARBOFURAN	GRANULADO	005	Aphis sp.	25-50 kg/ha	APLICACIÓN AL SUELO.
CARBOFURAN	GRANULADO	005	Agrotis sp.	30-40 kg/ha	APLICACIÓN AL SUELO.
CARBOFURAN	GRANULADO	003	Agrotis sp.	10-15 g/m2	APLICACIÓN AL SUELO.
CARBOFURAN	GRANULADO	005	Agrotis sp.	12 g/m2	APLICACIÓN AL SUELO.
CARBOFURAN	GRANULADO	005	Spodoptera frugiperda	10-15 kg/ha	APLICACIÓN AL SUELO.
CARBOFURAN	GRANULADO	005	Liriomyza sp.	30-40 kg/BANDA	APLICACIÓN AL SUELO.
CARBOFURAN	SUSPENSION ACUOSA	033	Phyllophaga sp.	10/200 L AGUA	APLICACIÓN AL SUELO.
CARBOFURAN	SUSPENSION ACUOSA	033	Phyllophaga sp.	200 cc/100 L	APLICACIÓN AL SUELO.
CARBOFURAN	SUSPENSION ACUOSA	033	Phyllophaga sp.	3.0-4.0 l/ha	APLICACIÓN AL SUELO.
CARBOFURAN	SUSPENSION ACUOSA	033	Phyllophaga sp.	3-4 l/ha	APLICACIÓN AL SUELO.
CARBOFURAN	SUSPENSION ACUOSA	033	Phyllophaga sp.	100 cc/100 L	APLICACIÓN AL SUELO.
CARBOFURAN	SUSPENSION ACUOSA	033	Meloidogyne sp.	400 cc/100 l AGUA	APLICACIÓN AL SUELO.
CARBOFURAN	SUSPENSION ACUOSA	033	Dorylaimus sp.	10-15 l/ha	APLICACIÓN AL SUELO.
CARBOFURAN	SUSPENSION ACUOSA	033	Agrotis sp.	3-4 l/ha	APLICACIÓN AL SUELO.
CARBOFURAN	SUSPENSION ACUOSA	044	Phyllophaga sp.	2.6-5.2 l/ha	APLICACIÓN AL SUELO.
CARBOFURAN	SUSPENSION ACUOSA	044	Diabrotica sp.	2.6-5.2	APLICACIÓN AL SUELO.
CLORTAL DIMETIL (DCPA)	POLVO HUMECTABLE	075	Amaranthus retroflexus	10-12 kg/ha	CONTROL DE MALEZAS.
CYPRDINIL + FLUDIOXONIL	GRANULOS DISPERSABLES	063	Botrytis cinerea	1-1.2 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
CYPRDINIL + FLUDIOXONIL	GRANULOS DISPERSABLES	063	Colletotrichum sp.	1-1.2 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
DIAZINON	CONCENTRADO EMULSIONABLE	025	Thrips sp.	2-3 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
DIAZINON	CONCENTRADO EMULSIONABLE	025	Steneotarsonemus pallidus	4.0-5.9 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
DIAZINON	CONCENTRADO EMULSIONABLE	025	Steneotarsonemus pallidus	1.0-1.5 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
DIAZINON	CONCENTRADO	025	Trialeurodes vaporariorum	4.0-5.0 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.

**SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
DIRECCION GENERAL DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA,
ACUICOLA Y PESQUERA**

FRESA

INGREDIENTE ACTIVO	FORMULACION %	PLAGA	DOSIS	USO AGRICOLA	
DIAZINON	EMULSIONABLE CONCENTRADO	025	Tetranychus sp.	4-5 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
DIAZINON	EMULSIONABLE CONCENTRADO	025	Empoasca sp.	1-2 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
DIAZINON	EMULSIONABLE CONCENTRADO	057	Tetranychus sp.	0.75-1.0 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
DIAZINON	EMULSIONABLE CONCENTRADO	025	Tetranychus telarius	4-5 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
DIAZINON	EMULSIONABLE CONCENTRADO	025	Tetranychus urticae	4.0-5.0 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
DIAZINON	EMULSIONABLE CONCENTRADO	025	Thrips sp.	4.0-5.0 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
DIAZINON	EMULSIONABLE CONCENTRADO	025	Trialeurodes sp.	3-4 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
DIAZINON	EMULSIONABLE CONCENTRADO	025	Trialeurodes sp.	5.0 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
DIAZINON	EMULSIONABLE CONCENTRADO	025	Trialeurodes sp.	4-5 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
DIAZINON	EMULSIONABLE CONCENTRADO	025	Steneotarsonemus pallidus	4.0-5.0 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
DIAZINON	EMULSIONABLE CONCENTRADO	025	Tetranychus telarius	0.10-1.5 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
DIAZINON	EMULSIONABLE CONCENTRADO	025	Pentatrichopus sp.	4.0-5.0 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
DIAZINON	EMULSIONABLE CONCENTRADO	025	Steneotarsonemus pallidus	5.0 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
DIAZINON	EMULSIONABLE CONCENTRADO	025	Diabrotica sp.	1.0-1.5 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
DIAZINON	EMULSIONABLE CONCENTRADO	025	Peridroma margaritosa	2-4 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
DIAZINON	EMULSIONABLE CONCENTRADO	025	Steneotarsonemus pallidus	4-5 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
DIAZINON	EMULSIONABLE CONCENTRADO	025	Pentatrichopus sp.	4-5 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
DIAZINON	DISP.(EMULSION ACEITE EN AGUA)	059	Trialeurodes vaporariorum	0.75-1.0 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
DIAZINON	DISP.(EMULSION ACEITE EN AGUA)	059	Tetranychus sp.	0.75-1.0 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
DIAZINON	GRANULADO	004	Dalopius sp.	40-60 kg/ha	APLICACIÓN AL SUELO.
DIAZINON	GRANULADO	014	Diabrotica sp.	16-20 kg/ha	APLICACIÓN AL SUELO.
DIAZINON	GRANULADO	004	Diabrotica sp.	40-60 kg/ha	APLICACIÓN AL SUELO.

**SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
DIRECCION GENERAL DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA,
ACUICOLA Y PESQUERA**

FRESA

INGREDIENTE ACTIVO	FORMULACION %	PLAGA	DOSIS	USO AGRICOLA	
DIAZINON	GRANULADO	005	Diabrotica sp.	20-30 kg/ha	APLICACIÓN AL SUELO.
DIAZINON	GRANULADO	005	Phyllophaga sp.	20-30 kg/ha	APLICACIÓN AL SUELO.
DIAZINON	GRANULADO	004	Feltia sp.	40-50 kg/ha	APLICACIÓN AL SUELO.
DIAZINON	GRANULADO	004	Melanotus sp.	40-60 kg/ha	APLICACIÓN AL SUELO.
DIAZINON	GRANULADO	004	Phyllophaga sp.	40-60 kg/ha	APLICACIÓN AL SUELO.
DIAZINON	GRANULADO	005	Phyllotreta sp.	20-25 kg/ha	APLICACIÓN AL SUELO.
DIAZINON	GRANULADO	004	Prodenia sp.	20-30 kg/ha	APLICACIÓN AL SUELO.
DIAZINON	GRANULADO	005	Feltia sp.	20-30 kg/ha	APLICACIÓN AL SUELO.
DIAZINON	GRANULADO	005	Agrotis sp.	20-30 kg/ha	APLICACIÓN AL SUELO.
DIAZINON	GRANULADO	005	Agriotes sp.	20-30 kg/ha	APLICACIÓN AL SUELO.
DIAZINON	GRANULADO	004	Agriotes sp.	40-60 kg/ha	APLICACIÓN AL SUELO.
DIAZINON	GRANULADO	004	Phyllophaga sp.	20-30 kg/ha	APLICACIÓN AL SUELO.
DIAZINON	GRANULADO	004	Agrotis sp.	40-60 kg/ha	APLICACIÓN AL SUELO.
DIAZINON	POLVO	003	Phyllophaga sp.	64-80 kg/ha	APLICACIÓN AL SUELO.
DIAZINON	POLVO	003	Diabrotica sp.	64-80 kg/ha	APLICACIÓN AL SUELO.
DIAZINON	POLVO	002	Atta sp.	70-100 kg	APLICACIÓN AL SUELO.
DIAZINON	POLVO HUMECTABLE	040	Tetranychus sp.	2.5-3.5 K	APLICACION AL FOLLAJE.
DIAZINON	POLVO HUMECTABLE	040	Steneotarsonemus pallidus	2.5-3.5 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
DICOFOL	CONCENTRADO EMULSIONABLE	019	Tetranychus telarius	2.0-2.5 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
DICOFOL	CONCENTRADO EMULSIONABLE	043	Tetranychus sp.	1.2-2.3 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
DICOFOL	CONCENTRADO EMULSIONABLE	043	Steneotarsonemus pallidus	1.2-2.3 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
DICOFOL	CONCENTRADO EMULSIONABLE	019	Steneotarsonemus pallidus	2.0-2.5 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
DICOFOL	CONCENTRADO EMULSIONABLE	018	Steneotarsonemus pallidus	9.4-14 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
DICOFOL	CONCENTRADO EMULSIONABLE	020	Steneotarsonemus pallidus	2-2.5 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
DICOFOL	POLVO HUMECTABLE	035	Steneotarsonemus pallidus	1.5-2.0 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
DICOFOL	POLVO HUMECTABLE	035	Tetranychus telarius	1.5-2.0 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
ENDOSULFAN	CONCENTRADO EMULSIONABLE	035	Pentatrichopus sp.	1.5-2.0 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
ENDOSULFAN	CONCENTRADO EMULSIONABLE	035	Steneotarsonemus pallidus	2-5 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
ENDOSULFAN	CONCENTRADO EMULSIONABLE	033	Steneotarsonemus pallidus	5.0 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
ENDOSULFAN	CONCENTRADO EMULSIONABLE	035	Steneotarsonemus pallidus	5.0 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
ENDOSULFAN	CONCENTRADO	033	Steneotarsonemus pallidus	1.5-2.0 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.

**SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
DIRECCION GENERAL DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA,
ACUICOLA Y PESQUERA**

FRESA

INGREDIENTE ACTIVO	FORMULACION %	PLAGA	DOSIS	USO AGRICOLA	
ENDOSULFAN	EMULSIONABLE CONCENTRADO	035	Steneotarsonemus pallidus	5 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
ENDOSULFAN	EMULSIONABLE CONCENTRADO	033	Pentatrichopus sp.	1.5-2.0 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
ENDOSULFAN	EMULSIONABLE CONCENTRADO	033	Aphis sp.	1.5-2.0 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
ENDOSULFAN	EMULSIONABLE CONCENTRADO	035	Pentatrichopus sp.	2-3 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
ENDOSULFAN	EMULSIONABLE CONCENTRADO	033	Pentatrichopus sp.	2.0-3.0 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
ENDOSULFAN	EMULSIONABLE CONCENTRADO	035	Pentatrichopus sp.	1-1.5 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
ENDOSULFAN	EMULSIONABLE CONCENTRADO	035	Pentatrichopus sp.	1.5-2 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
ENDOSULFAN	EMULSIONABLE CONCENTRADO	035	Pentatrichopus sp.	1.5.2.0 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
ENDOSULFAN	EMULSIONABLE CONCENTRADO	035	Pentatrichopus fragaefollii	1.5-2 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
ENDOSULFAN	EMULSIONABLE CONCENTRADO	033	Helicoverpa zea	2.5-3 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
ENDOSULFAN	EMULSIONABLE CONCENTRADO	033	Steneotarsonemus pallidus	5 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
ENDOSULFAN	EMULSIONABLE CONCENTRADO	035	Pentatrichopus sp.	2.0-3.0 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
ENDOSULFAN	EMULSIONABLE CONCENTRADO	033	Trialeurodes sp.	2.0-3.0 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
ENDOSULFAN	EMULSIONABLE CONCENTRADO	035	Thrips sp.	2-3 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
ENDOSULFAN	EMULSIONABLE CONCENTRADO	033	Tetranychus urticae	2-3 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
ENDOSULFAN	EMULSIONABLE CONCENTRADO	033	Tetranychus telarius	2-3 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
ENDOSULFAN	EMULSIONABLE CONCENTRADO	035	Thrips sp.	1-3 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
ENDOSULFAN	EMULSIONABLE CONCENTRADO	033	Trialeurodes sp.	1.5-2 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
ENDOSULFAN	EMULSIONABLE CONCENTRADO	033	Trialeurodes vaporariorum	3 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
ENDOSULFAN	EMULSIONABLE CONCENTRADO	035	Trialeurodes vaporariorum	2-3 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
ENDOSULFAN	CONCENTRADO	035	Trialeurodes sp.	2.0-3.0 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.

**SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
DIRECCION GENERAL DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA,
ACUICOLA Y PESQUERA**

FRESA

INGREDIENTE ACTIVO	FORMULACION %	PLAGA	DOSIS	USO AGRICOLA	
ENDOSULFAN	EMULSIONABLE CONCENTRADO	033	Trialeurodes floridensis	1.5-2.0 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
ENDOSULFAN	EMULSIONABLE CONCENTRADO	035	Thrips sp.	1.5-2.0 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
ENDOSULFAN	EMULSIONABLE CONCENTRADO	035	Trialeurodes sp.	2-3 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
ENDOSULFAN	EMULSIONABLE CONCENTRADO	035	Steneotarsonemus pallidus	2-3 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
ENDOSULFAN	EMULSIONABLE CONCENTRADO	035	Tetranychus telarius	2.0-3.0 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
ENDOSULFAN	EMULSIONABLE CONCENTRADO	035	Tetranychus telarius	2-3 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
ENDOSULFAN	EMULSIONABLE CONCENTRADO	035	Tetranychus telarius	5 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
ENDOSULFAN	EMULSIONABLE CONCENTRADO	033	Steneotarsonemus pallidus	3-5 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
ENDOSULFAN	EMULSIONABLE CONCENTRADO	035	Steneotarsonemus pallidus	3.0-5.0 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
ENDOSULFAN	EMULSIONABLE CONCENTRADO	035	Steneotarsonemus pallidus	1.5-2 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
ENDOSULFAN	EMULSIONABLE CONCENTRADO	035	Steneotarsonemus pallidus	1.5-5.0 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
ENDOSULFAN	EMULSIONABLE CONCENTRADO	035	Steneotarsonemus pallidus	2.0-3.0 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
ENDOSULFAN	EMULSIONABLE CONCENTRADO	030	Steneotarsonemus pallidus	1.5-2.0 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
ENDOSULFAN	EMULSIONABLE CONCENTRADO	035	Steneotarsonemus pallidus	1.5-3 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
ENDOSULFAN	EMULSIONABLE CONCENTRADO	035	Steneotarsonemus pallidus	1.5-2.0 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
ENDOSULFAN	POLVO	004	Trialeurodes sp.	20-25 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
ENDOSULFAN	POLVO	004	Trialeurodes sp.	15-25 kg/H	APLICACION AL FOLLAJE.
ENDOSULFAN	POLVO HUMECTABLE	053	Thrips sp.	0.9-1.4 kg/100l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
ENDOSULFAN	POLVO HUMECTABLE	050	Pentatrichopus sp.	1-1.5 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
ENDOSULFAN	POLVO HUMECTABLE	053	Empoasca sp.	0.9-1.4 kg/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
ENDOSULFAN	POLVO HUMECTABLE	050	Steneotarsonemus pallidus	1.0-1.5 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
ETION	EMULSIONABLE CONCENTRADO	049	Lygus sp.	1.5-2 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
ETOXAZOLE	SUSPENSION CONCENTRADA	010	Tetranychus urticae	200-450 ml/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
FENHEXAMID	GRANULOS DISPERSABLES	054	Botrytis cinerea	1.7-2.2 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
FENPROPATRIN	CONCENTRADO	031	Tetranychus urticae	0.5-0.7 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.

**SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
DIRECCION GENERAL DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA,
ACUICOLA Y PESQUERA**

FRESA

INGREDIENTE ACTIVO	FORMULACION %	PLAGA	DOSIS	USO AGRICOLA	
FENPROPATRIN	EMULSIONABLE CONCENTRADO EMULSIONABLE	039	Tetranychus urticae	0.5-0.6 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
FOLPET	GRANULOS DISPERSABLES	080	Mycosphaerella fragariae	10-20 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
FOLPET	GRANULOS DISPERSABLES	080	Colletotrichum sp.	10-20 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
FOLPET	GRANULOS DISPERSABLES	080	Alternaria sp.	10-20 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
FOLPET	POLVO HUMECTABLE	050	Puccinia recondita	1.5-2.5 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
FOLPET	POLVO HUMECTABLE	050	Fusarium sp.	1.5-2.5 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
FOLPET	POLVO HUMECTABLE	080	Mycosphaerella fragariae	1-2 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
FOLPET	POLVO HUMECTABLE	080	Mycosphaerella fragariae	10-20 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
FOLPET	POLVO HUMECTABLE	050	Alternaria sp.	1.5-2.5 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
FOLPET	POLVO HUMECTABLE	050	Mycosphaerella fragariae	10-20 kg/ha.	APLICACION AL FOLLAJE.
FOLPET	POLVO HUMECTABLE	050	Colletotrichum sp.	1.5-2.5 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
FOLPET	POLVO HUMECTABLE	080	Alternaria sp.	1-2 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
FOLPET	POLVO HUMECTABLE	080	Colletotrichum sp.	1-2 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
FOLPET	POLVO HUMECTABLE	080	Mycosphaerella fragariae	1.0-2.0 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
FOLPET	SUSPENSION ACUOSA	039	Mycosphaerella fragariae	1.5-2.5 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
FOLPET	SUSPENSION ACUOSA	039	Mycosphaerella fragariae	1.5-2.0 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
FOLPET	SUSPENSION ACUOSA	039	Alternaria sp.	1.5-2.5 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
FOLPET	SUSPENSION ACUOSA	039	Colletotrichum sp.	1.5-2.5 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
FOLPET	SUSPENSION ACUOSA	039	Colletotrichum sp.	1.5-2.0 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
FOLPET	SUSPENSION ACUOSA	039	Fusarium sp.	1.5-2.5 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
FOLPET	SUSPENSION ACUOSA	031	Mycosphaerella fragariae	1.5-2.0 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
FOLPET	SUSPENSION ACUOSA	048	Mycosphaerella fragariae	1.5-2.0 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
FOLPET	SUSPENSION ACUOSA	039	Puccinia recondita	1.5-2.5 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
FONOFOS (DYFONATE)	GRANULADO	003	Phyllophaga sp.	20 kg/ha	APLICACION AL SUELO.
FOSETIL-AL	GRANULOS DISPERSABLES	080	Phytophthora sp.	2.5 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
FOSETIL-AL	POLVO HUMECTABLE	080	Phytophthora fragariae	2.5 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
HEXITIAZOX	GRANULOS DISPERSABLES	050	Tetranychus urticae	300-400 g/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
HEXITIAZOX	POLVO HUMECTABLE	050	Tetranychus urticae	18-24 gr/100 L	APLICACION AL FOLLAJE.
HIDROXIDO CUPRICO	POLVO HUMECTABLE	077	Mycosphaerella fragariae	400 g/100L	APLICACION AL FOLLAJE.
HIDROXIDO CUPRICO	POLVO HUMECTABLE	077	Mycosphaerella fragariae	200-400g/100 L	APLICACION AL FOLLAJE.
HIDROXIDO CUPRICO	POLVO HUMECTABLE	077	Xanthomonas fragariae	2-4 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
HIDROXIDO CUPRICO	POLVO HUMECTABLE	086	Phytophthora fragariae	2-4 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
HIDROXIDO CUPRICO	POLVO HUMECTABLE	077	Botrytis cinerea	2.0-4.0 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
HIDROXIDO CUPRICO	POLVO HUMECTABLE	077	Mycosphaerella fragariae	2.0-4.0 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
HIDROXIDO CUPRICO	POLVO HUMECTABLE	086	Botrytis cinerea	2-4 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
HIDROXIDO CUPRICO	POLVO HUMECTABLE	086	Alternaria sp.	2-4 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
HIDROXIDO CUPRICO	POLVO HUMECTABLE	077	Mycosphaerella fragariae	200-400 g/100 l	APLICACION AL FOLLAJE.
HIDROXIDO CUPRICO	SUSPENSION ACUOSA	023	Mycosphaerella fragariae	200-300cc/100L	APLICACION AL FOLLAJE.

**SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
DIRECCION GENERAL DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA,
ACUICOLA Y PESQUERA**

FRESA

INGREDIENTE ACTIVO	FORMULACION %	PLAGA	DOSIS	USO AGRICOLA	
HIDROXIDO CUPRICO	SUSPENSION ACUOSA	023	Mycosphaerella fragariae	200-300 ml/100L	APLICACION AL FOLLAJE.
HIDROXIDO CUPRICO	SUSPENSION ACUOSA	023	Mycosphaerella fragariae	300cc/100L	APLICACION AL FOLLAJE.
HIDROXIDO CUPRICO	SUSPENSION ACUOSA	023	Mycosphaerella fragariae	200-300 cc/100L	APLICACION AL FOLLAJE.
HIDROXIDO CUPRICO	SUSPENSION ACUOSA	022	Botrytis cinerea	1-3 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
IPRODIONA	POLVO HUMECTABLE	050	Botrytis cinerea	1.5 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
MALATION	CONCENTRADO EMULSIONABLE	083	Trialeurodes vaporariorum	1-1.5 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
MALATION	CONCENTRADO EMULSIONABLE	084	Pentatrichopus sp.	1.0-1.5 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
MALATION	CONCENTRADO EMULSIONABLE	050	Pentatrichopus sp.	2.5-3 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
MALATION	CONCENTRADO EMULSIONABLE	084	Pentatrichopus sp.	1.0 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
MALATION	CONCENTRADO EMULSIONABLE	083	Pentatrichopus sp.	0.5-2.0 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
MALATION	CONCENTRADO EMULSIONABLE	050	Pentatrichopus sp.	2.0-3.0 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
MALATION	CONCENTRADO EMULSIONABLE	084	Trialeurodes sp.	1.0-1.5 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
MALATION	CONCENTRADO EMULSIONABLE	050	Trialeurodes sp.	2-3 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
MALATION	CONCENTRADO EMULSIONABLE	050	Pentatrichopus sp.	2-3 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
MALATION	CONCENTRADO EMULSIONABLE	084	Trialeurodes sp.	1-1.5 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
MALATION	CONCENTRADO EMULSIONABLE	050	Thrips sp.	2.0-3.0 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
MALATION	CONCENTRADO EMULSIONABLE	083	Heliothis sp.	1.0-1.5 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
MALATION	CONCENTRADO EMULSIONABLE	049	Heliothis sp.	2-3 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
MALATION	CONCENTRADO EMULSIONABLE	057	Heliothis sp.	2-3 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
MALATION	CONCENTRADO EMULSIONABLE	083	Helicoverpa zea	0.5-2.0 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
MALATION	CONCENTRADO EMULSIONABLE	083	Helicoverpa zea	1.0-1.5 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
MALATION	CONCENTRADO EMULSIONABLE	050	Thrips sp.	2-3 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
MALATION	CONCENTRADO EMULSIONABLE	084	Thrips sp.	1-1.5 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
MALATION	CONCENTRADO	084	Thrips sp.	1.0-1.5 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.

**SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
DIRECCION GENERAL DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA,
ACUICOLA Y PESQUERA**

FRESA

INGREDIENTE ACTIVO	FORMULACION %	PLAGA	DOSIS	USO AGRICOLA	
MALATION	EMULSIONABLE CONCENTRADO	083	Pentatrichopus sp.	1.0-1.5 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
MALATION	EMULSIONABLE CONCENTRADO	083	Aconophora sp.	0.5-2.0 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
MALATION	EMULSIONABLE CONCENTRADO	084	Pentatrichopus sp.	1-1.5 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
MALATION	EMULSIONABLE CONCENTRADO	083	Trialeurodes sp.	1.0-1.5 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
MALATION	POLVO	004	Pentatrichopus sp.	25 K/ha.	APLICACION AL FOLLAJE.
MALATION	POLVO	004	Trialeurodes sp.	15-25 kg/H	APLICACION AL FOLLAJE.
MALATION	POLVO	004	Trialeurodes sp.	25 K/ha.	APLICACION AL FOLLAJE.
MALATION	POLVO	004	Thrips sp.	25 K/ha.	APLICACION AL FOLLAJE.
METALAXIL	EMULSIONABLE CONCENTRADO	025	Phytophthora sp.	5 l/ha	APLICACIÓN AL SUELO.
METALAXIL-M	EMULSIONABLE CONCENTRADO	046	Phytophthora cactorum	1.5-2.5 l/ha	APLICACIÓN AL SUELO.
METOMILO	POLVO SOLUBLE	040	Spodoptera exigua	600-1200 g/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
METOMILO	POLVO SOLUBLE	090	Helicoverpa zea	0.35-0.40 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
METOMILO	POLVO SOLUBLE	090	Helicoverpa zea	350-400 g/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
METOMILO	POLVO SOLUBLE	040	Helicoverpa zea	600-1200 g/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
METOMILO	POLVO SOLUBLE	040	Frankliniella sp.	600-1200 g/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
METOMILO	POLVO SOLUBLE	090	Trichoplusia ni	350-400 g/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
METOMILO	POLVO SOLUBLE	090	Trichoplusia ni	0.35-0.40 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
METOMILO	POLVO SOLUBLE	090	Heliothis sp.	400 gr/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
METOMILO	POLVO SOLUBLE	090	Trialeurodes vaporariorum	300-400 g/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
METOMILO	POLVO SOLUBLE	090	Trialeurodes vaporariorum	350-400 g/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
METOMILO	POLVO SOLUBLE	090	Trialeurodes vaporariorum	0.35-0.40 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
METOMILO	POLVO SOLUBLE	090	Spodoptera exigua	350-400 g/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
METOMILO	POLVO SOLUBLE	090	Bemisia tabaci	300-400 g/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
METOMILO	POLVO SOLUBLE	090	Bemisia tabaci	350-400 g/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
METOMILO	POLVO SOLUBLE	090	Trichoplusia ni	300-400 g/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
METOMILO	POLVO SOLUBLE	040	Bemisia tabaci	600-1200 g/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
METOMILO	ACUOSA SOLUCION CONCENTRADA	029	Keyferia lycopersicella	1-2 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
MEVINFOS	LIQUIDO SOLUBLE	099	Tetranychus sp.	0.1-0.2 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
MEVINFOS	LIQUIDO SOLUBLE	099	Pentatrichopus sp.	0.1-0.2 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
MEVINFOS	LIQUIDO SOLUBLE	099	Liriomyza sp.	0.1-0.2 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
MEVINFOS	LIQUIDO SOLUBLE	099	Liriomyza sp.	0.2-0.4 l/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
MEVINFOS	LIQUIDO SOLUBLE	099	Frankliniella sp.	0.1-0.2 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
MEVINFOS + PARATION METILICO	CONCENTRADO	055	Trichoplusia ni	1.5-2.0 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.

**SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
DIRECCION GENERAL DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA,
ACUICOLA Y PESQUERA**

FRESA

INGREDIENTE ACTIVO	FORMULACION %	PLAGA	DOSIS	USO AGRICOLA	
MEVINFOS + PARATION METILICO	EMULSIONABLE CONCENTRADO	055	Acyrtosiphon dirhodum	1.5-2 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
MEVINFOS + PARATION METILICO	EMULSIONABLE CONCENTRADO	055	Diabrotica sp.	1.5-2.0 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
MEVINFOS + PARATION METILICO	EMULSIONABLE CONCENTRADO	055	Tetranychus sp.	1.5-2.0 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
MEVINFOS + PARATION METILICO	EMULSIONABLE CONCENTRADO	055	Lygus lineolaris	1.5-2.0 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
NALED	EMULSIONABLE CONCENTRADO	058	Tetranychus telarius	1.5-2 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
NALED	EMULSIONABLE CONCENTRADO	058	Steneotarsonemus pallidus	1.5-2.0 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
NALED	EMULSIONABLE CONCENTRADO	060	Manduca quinquemaculata	150-200 cc/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
NALED	EMULSIONABLE CONCENTRADO	066	Pentatrichopus sp.	1.5 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
NALED	EMULSIONABLE CONCENTRADO	060	Pentatrichopus sp.	1.5-2 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
NALED	EMULSIONABLE CONCENTRADO	058	Steneotarsonemus pallidus	1.0-2.0 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
NALED	EMULSIONABLE CONCENTRADO	060	Tetranychus telarius	1.5-2 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
NALED	EMULSIONABLE CONCENTRADO	060	Trialeurodes sp.	1-2 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
NALED	EMULSIONABLE CONCENTRADO	067	Tetranychus urticae	1.5 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
NALED	EMULSIONABLE CONCENTRADO	060	Pentatrichopus sp.	1-2 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
NAPROPAMIDA	EMULSIONABLE CONCENTRADO	020	Avena fatua	18.75 l/ha	CONTROL DE MALEZAS.
OLEATO CUPRICO	EMULSIONABLE CONCENTRADO	027	Botrytis cinerea	1-2.5 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
OLEATO CUPRICO	EMULSIONABLE CONCENTRADO	022	Mycosphaerella fragariae	2-2.5 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
OXICLORURO DE COBRE	GRANULOS DISPERSABLES	085	Mycosphaerella fragariae	3-3.5 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
OXICLORURO DE COBRE	POLVO HUMECTABLE	085	Mycosphaerella sp.	2-3 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
OXICLORURO DE COBRE	POLVO HUMECTABLE	085	Mycosphaerella fragariae	2.0-4.0 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
OXICLORURO DE COBRE	POLVO HUMECTABLE	085	Taphrina deformans	400-450g/100 L	APLICACION AL FOLLAJE.
OXICLORURO DE COBRE	POLVO HUMECTABLE	085	Mycosphaerella fragariae	3.0-3.5 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
OXICLORURO DE COBRE	POLVO HUMECTABLE	085	Mycosphaerella fragariae	2.4 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
OXICLORURO DE COBRE	POLVO HUMECTABLE	085	Mycosphaerella fragariae	3-3.5 K/ha	APLICACION AL FOLLAJE.

**SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
DIRECCION GENERAL DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA,
ACUICOLA Y PESQUERA**

FRESA

INGREDIENTE ACTIVO	FORMULACION %	PLAGA	DOSIS	USO AGRICOLA	
OXICLORURO DE COBRE	POLVO HUMECTABLE	085	Botrytis cinerea	2.0-4.0 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
OXICLORURO DE COBRE	POLVO HUMECTABLE	085	Botrytis cinerea	2-4 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
OXICLORURO DE COBRE	POLVO HUMECTABLE	085	Alternaria sp.	2-4 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
OXICLORURO DE COBRE	POLVO HUMECTABLE	085	Mycosphaerella fragariae	2-4 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
OXICLORURO DE COBRE	SUSPENSION ACUOSA	023	Botrytis cinerea	3-4 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
OXICLORURO DE COBRE	SUSPENSION ACUOSA	023	Mycosphaerella fragariae	3.0-4.0 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
OXICLORURO DE COBRE	SUSPENSION ACUOSA	023	Mycosphaerella fragariae	3-4 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
OXICLORURO DE COBRE	SUSPENSION ACUOSA	041	Mycosphaerella fragariae	3.5-4.5 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
OXICLORURO DE COBRE	SUSPENSION ACUOSA	023	Mycosphaerella fragariae	0.300-0.500 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
OXICLORURO DE COBRE	SUSPENSION ACUOSA	023	Botrytis cinerea	1.5-3 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
OXICLORURO DE COBRE	SUSPENSION ACUOSA	023	Alternaria sp.	300-500cc/100 L	APLICACION AL FOLLAJE.
OXICLORURO DE COBRE	SUSPENSION ACUOSA	023	Alternaria sp.	2-4 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
OXICLORURO DE COBRE	SUSPENSION ACUOSA	023	Alternaria sp.	0.3-0.5 l/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
OXICLORURO DE COBRE	SUSPENSION ACUOSA	023	Alternaria solani	500 ml/100	APLICACION AL FOLLAJE.
OXICLORURO DE COBRE	SUSPENSION ACUOSA	022	Mycosphaerella fragariae	300-500cc/100 L	APLICACION AL FOLLAJE.
OXICLORURO DE COBRE	SUSPENSION ACUOSA	022	Botrytis cinerea	300-500cc/100 L	APLICACION AL FOLLAJE.
OXIDEMETON METIL	CONCENTRADO EMULSIONABLE	023	Tetranychus telarius	2 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
OXIDO DE FENBUTATIN	SUSPENSION CONCENTRADA	045	Tetranychus urticae	0.5 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
OXIDO DE FENBUTATIN	SUSPENSION CONCENTRADA	045	Tetranychus urticae	0.5 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
PARATION METILICO	CONCENTRADO EMULSIONABLE	047	Pentatrichopus sp.	1.0 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
PARATION METILICO	CONCENTRADO EMULSIONABLE	063	Thrips sp.	0.75 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
PARATION METILICO	CONCENTRADO EMULSIONABLE	047	Thrips sp.	1.0 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
PARATION METILICO	CONCENTRADO EMULSIONABLE	063	Tetranychus telarius	0.75 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
PARATION METILICO	CONCENTRADO EMULSIONABLE	047	Steneotarsonemus pallidus	1.5 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
PARATION METILICO	CONCENTRADO EMULSIONABLE	063	Pentatrichopus sp.	0.75 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
PARATION METILICO	CONCENTRADO EMULSIONABLE	047	Heliothis virescens	1.0-1.5 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
PARATION METILICO	CONCENTRADO EMULSIONABLE	063	Helicoverpa zea	0.75 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
PARATION METILICO	CONCENTRADO EMULSIONABLE	063	Heliothis virescens	0.75 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
PARATION METILICO	CONCENTRADO EMULSIONABLE	063	Empoasca sp.	0.75 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
PARATION METILICO	CONCENTRADO	047	Empoasca sp.	1.0 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.

**SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
DIRECCION GENERAL DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA,
ACUICOLA Y PESQUERA**

FRESA

INGREDIENTE ACTIVO	FORMULACION %	PLAGA	DOSIS	USO AGRICOLA	
	EMULSIONABLE				
PARATION METILICO	MICROENCAPSULADO	022	Steneotarsonemus pallidus	2.5 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
PARATION METILICO	MICROENCAPSULADO	040	Pentatrichopus sp.	0.75-1.0 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
PARATION METILICO	POLVO	002	Tetranychus telarius	25 K/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
PARATION METILICO	POLVO	003	Agrotis sp.	15 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
PARATION METILICO	POLVO	003	Thrips sp.	15-30 kg	APLICACION AL FOLLAJE.
PARATION METILICO	POLVO	002	Steneotarsonemus pallidus	20-25 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
PARATION METILICO	POLVO	003	Empoasca sp.	15-30 kg	APLICACION AL FOLLAJE.
PARATION METILICO	POLVO	002	Pentatrichopus sp.	20-25 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
PARATION METILICO	POLVO	003	Pentatrichopus sp.	15-30 K/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
PARATION METILICO	POLVO	002	Pentatrichopus sp.	15-30 K/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
PARATION METILICO	POLVO	002	Helicoverpa zea	20-25 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
PARATION METILICO	POLVO	003	Phyllophaga sp.	15-30 kg	APLICACION AL FOLLAJE.
PARATION METILICO	POLVO	002	Thrips tabaci	20-25 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
PROPARGITE	CONCENTRADO EMULSIONABLE	068	Tetranychus urticae	1.0-1.5 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
PROPARGITE	CONCENTRADO EMULSIONABLE	068	Tetranychus telarius	1.0-1.5 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
PROPARGITE	CONCENTRADO EMULSIONABLE	068	Tetranychus telarius	1-1.5 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
PROPARGITE	POLVO EN BOLSA SOLUBLE EN AGUA	030	Tetranychus urticae	4.0 K/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
PROPARGITE	POLVO EN BOLSA SOLUBLE EN AGUA	030	Tetranychus urticae	3-4 K/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
PROPARGITE	POLVO HUMECTABLE	030	Tetranychus urticae	3-4 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
PROPARGITE	POLVO HUMECTABLE	030	Tetranychus sp.	3-4 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
QUINTOZENO "USO RESTRINGIDO"	CONCENTRADO EMULSIONABLE	024	Sclerotium rolfsii	10-20 l/ha	APLICACION AL SUELO AL MOMENTO DE LA SIEMBRA.
SIMAZINA	GRANULOS DISPERSABLES	090	Datura stramonium	2.0-3.0 K/ha	CONTROL DE MALEZAS.
SIMAZINA	POLVO HUMECTABLE	050	Chenopodium album	3-4 kg/ha	CONTROL DE MALEZAS.
SIMAZINA	POLVO HUMECTABLE	050	Ipomoea purpurea	3-4 K/ha	CONTROL DE MALEZAS.
SIMAZINA	SUSPENSION ACUOSA	044	Polygonum aviculare	3-4 l/ha	CONTROL DE MALEZAS.
SPINOSAD	SUSPENSION CONCENTRADA	012	Frankliniella occidentalis	200-400 ml/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
SPIROMESIFEN	SUSPENSION CONCENTRADA	023	Tetranychus urticae	0.9-1.2 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
SULFATO DE COBRE	CRISTALES SOLUBLES	098	Botrytis cinerea	4-6 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
SULFATO DE COBRE	POLVO HUMECTABLE	093	Botrytis cinerea	400 g/100L	APLICACION AL FOLLAJE.
SULFATO DE COBRE	POLVO HUMECTABLE	093	Mycosphaerella fragariae	2.8 kg/100 L	APLICACION AL FOLLAJE.
SULFATO DE COBRE	POLVO HUMECTABLE	093	Mycosphaerella fragariae	3-4 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
SULFATO DE COBRE	POLVO HUMECTABLE	093	Mycosphaerella fragariae	1.0 kg/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
SULFATO DE COBRE	POLVO HUMECTABLE	093	Botrytis cinerea	1.0 kg/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
SULFATO DE COBRE	SOLIDO SOLUBLE	098	Mycosphaerella fragariae	4-6 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.

**SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
DIRECCION GENERAL DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA,
ACUICOLA Y PESQUERA**

FRESA

INGREDIENTE ACTIVO	FORMULACION %	PLAGA	DOSIS	USO AGRICOLA	
SULFATO DE COBRE	SOLUCION ACUOSA	021	Xanthomonas sp.	0.75-1.5 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
SULFATO DE COBRE	SOLUCION ACUOSA	021	Botrytis cinerea	1.0-1.5 L/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
SULFATO DE COBRE	SOLUCION ACUOSA	021	Sphaerotheca humuli	0.75-1.5 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
SULFATO DE COBRE	SOLUCION ACUOSA	021	Mycosphaerella fragariae	0.75-1.5 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
SULFATO DE COBRE	SOLUCION ACUOSA	021	Botrytis cinerea	0.75-1.5 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
SULFATO DE COBRE	SOLUCION ACUOSA	021	Pseudomonas sp.	0.75-1.5 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
THIRAM	GRANULOS DISPERSABLES	080	Botrytis cinerea	1.6-3.2 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
TIABENDAZOL	SUSPENSION ACUOSA	043	Gloeosporium fragariae	1.5-2.0 ml/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
TIABENDAZOL	SUSPENSION ACUOSA	043	Gloeosporium frunctigenum	1.5-2.0 ml/100 l agua	APLICACION AL FOLLAJE.
TIOFANATO-METILICO	POLVO HUMECTABLE	070	Botrytis sp.	0.7-1.0 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
Trichoderma harzianum	POLVO SOLUBLE	020	Botrytis cinerea	2.5-3.5 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
TRIFLUMIZOLE	POLVO HUMECTABLE	050	Sphaerotheca macularis	0.40-0.50 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
TRIFORINE	CONCENTRADO EMULSIONABLE	019	Mycosphaerella fragariae	1.0 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
TRIFORINE	CONCENTRADO EMULSIONABLE	019	Sphaerotheca humuli	1.0 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
TRIFORINE	CONCENTRADO EMULSIONABLE	019	Sphaerotheca macularis	1.0 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
TRIFORINE	CONCENTRADO EMULSIONABLE	019	Sphaerotheca pannosa	1.0 l/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
VINCLOZOLIN	GRANULOS DISPERSABLES	050	Botrytis cinerea	1.5-2 kg/ha	APLICACION AL FOLLAJE.
VINCLOZOLIN	POLVO HUMECTABLE	050	Botrytis cinerea	2.0 kg*/ha	APLICACION AL FOLLAJE.